Gevoeligheidstabel onkruiden - 2022

	aclonifen (Challenge)	**aclonifen + clomazon** (Novitron DAM[eco])	**aclonifen + flufenacet** (Gofor, ...)	**clomazon** (Centium 36 CS, ...)	**clomazon + pendimethalin** (Stallion SYNC tec)	**pendimethalin** (Stomp Aqua, ...)	**diflufenican + metribuzin** (Tavas)	**clomazon + metobromuron** (Amazone)	**clomazon + metribuzin** (Metric, ...)	**metribuzin + flufenacet** (Artist)	**metobromuron** (Proman, ...)	**prosulfocarb** (Defi, ...)	**metribuzin** (Sencor WG, ...)	**rimsulfuron** (Titus)
Akkervioolje	2	1-2	1-2	4	2	2	1-2	3	2-3	2	3	4	2-3	2-3
Bingelkruid	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2**	4
Doornappel	3-4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1,5	4
Duist	2	2-3	1	4	2-3	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Duivenkervel	1	1	1	4	2	2	1-2	3	2	1	2	3	2**	4
Ereprijs	3-4	3-4	2	3-4	1	1	1	2	3	3	2-3	2	3	4
Hanenpoot	2-3	2-3	1-2	3	2-3	2-3	2	1-2	3	2	2	4	3-4	1
Herderstasje	1	1	1	1	1	4	1	1	1	2	1	1	2	1
Kamille	4	3	1-2	4	2-3	2-3	2	1	2	1	1	4	1	1
Kleefkruid	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	1	1-2	2	3	1-2	4	1
Melganzevoet*	1	1	1	3	1-2	1	2-3	1-2	3	3	1-2	4	3**	4
Muur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Paarse dovenetel	4	2-3	1	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2
Perzikkruid	2	2	1-2	2	1-2	1-2	2	2	2	2	2	2-3	2**	2-3
Straatgras	2	1-2	1	3	2	2	1	1-2	1-2	1	2	1	1	1
Varkensgras	4	1-2	3	1-2	1-2	1-2	2	1	1-2	2-3	1-2	3	3**	4
Zwaluwtong	1-2	1	2	2	2	2-3	1-2	1	2	4	1-2	3-4	3-4	3
Zwarte nachtschade	4	2	3	2	2-3	2	3	1-2	3	2-3	3	2-3	4	4
Tijdstip van toepassen herbicide	**Ruim vóór-opkomst (5 dagen)**							**Kort voor opkomst**		**Tot bij opkomst**			**Na-opkomst**	

1 = zeer goed; 2 = goed; 3 = matig goed; 4 = onvoldoende

*** niet resistente melganzenvoet**

**** zeer goed in na-opkomst op jonge onkruiden**

Onkruidbestrijding in aardappelen

Kennis van de onkruiden

Om tot een goed resultaat te komen dienen middelen gekozen te worden in functie van de verwachte onkruiden. Kennis van het perceel speelt hier een grote rol. Hiernaast worden de meest voorkomende onkruiden bij de aardappelen afgebeeld. In de gevoeligheidstabel (zie ommezijde) is per herbicide af te lezen hoe goed de werking is op de verschillende onkruiden.

Tijdstip van behandelen

De onkruidbestrijding in aardappelen is gestoeld op een degelijke vooropkomst behandeling. Een toepassing in na-opkomst dient vooral gezien te worden als een corrigerende toepassing: er zijn immers maar een beperkt aantal middelen erkend die niet het volledige onkruidspectrum aanpakken.

Het beste resultaat wordt in principe bekomen door kort vóór opkomst op goed bezakte ruggen te behandelen. In de praktijk zal echter een compromis gezocht moeten worden tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden (windstil weer, neerslag) anderzijds. Bijna alle middelen hebben een voldoende lange nawerking en meestal zien we na een regenbui de onkruiden opnieuw verdwijnen. Van zodra de weersomstandigheden na het planten gunstig zijn en de bodem ook nog vochtig is of er regen voorspeld is, wordt een behandeling best niet uitgesteld.

PCA
inagro
ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW

pca@proefcentrum-kruishoutem.be
(09) 381 86 86

info.aardappelen@inagro.be
(051) 27 32 00

Veel voorkomende onkruiden bij aardappelen


Akkervioolt je


Bingelkruid


Doornappel


Duist


Duivenkervel


Ereprijs


Hanepoot


Herderstasje



Kamille


Kleefkruid


Melganzevoet


Muur


Paarse dovenetel


Perzikkruid


Straatgras


Varkensgras


Zwaluwtong


Zwart nachtschade